

正本

衛生福利部 函

機關地址：11558 台北市南港區忠孝東路六段488號

傳 真：02-27877498

聯絡人及電話：張婷雅 02-27877411

11070

台北市信義區基隆路1段141號13樓之6

受文者：中華民國製藥發展協會

發文日期：中華民國105年9月5日

發文字號：部授食字第1051407977號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：公告影本1份

主旨：檢送修正本部104年9月1日部授食字第1041407906B號公
告「含銀杏葉抽出物成分（Ginkgo biloba extract）口服劑
型藥品中文仿單修訂相關事宜」影本1份，惠請轉知所屬
會員，請查照。

正本：台灣製藥工業同業公會、中華民國製藥發展協會、中華民國西藥商業同業公會
全國聯合會、社團法人中華民國學名藥協會、中華民國藥劑生公會全國聯合
會、台灣社區醫院協會、中華民國基層醫療協會、台灣藥物臨床研究協會、台
北市西藥代理商業同業公會、中華民國西藥代理商業同業公會、中華民國藥品
行銷暨管理協會、中華民國開發性製藥研究協會、中華民國醫師公會全國聯合
會、中華民國藥師公會全國聯合會、台灣醫院協會

副本：全國藥物不良反應通報中心、財團法人醫藥品查驗中心

部長林奏延


張貼公告欄

衛生福利部 公告

發文日期：中華民國105年9月5日

發文字號：部授食字第1051407954號

附件：含銀杏葉抽出物成分(Ginkgo biloba extract)口服劑型指示藥品中文仿單修訂



主旨：修正本部104年9月1日部授食字第1041407906B號公告
「含銀杏葉抽出物成分(Ginkgo biloba extract)口服劑型
藥品中文仿單修訂相關事宜」。

依據：藥事法第48條。

公告事項：

- 一、配合非處方藥品仿單口語化，修訂旨揭公告含銀杏葉抽出物成分(Ginkgo biloba extract)口服劑型藥品中文仿單內容。含該成分口服劑型「指示藥品」中文仿單刊載內容修正如附件。另含該成分口服劑型「處方藥品」則依原公告內容刊載。
- 二、持有含銀杏葉抽出物成分(Ginkgo biloba extract)成分口服劑型指示藥品許可證者，應依本部105年3月8日部授食字第1051402838號公告之公告事項二、(三)「標籤仿單外盒核定、變更作業，及市售品處理原則」規定辦理標籤仿單變更及市售品處理等相關事宜。

副本：衛生福利部食品藥物管理署藥品組

部長林奏延

含銀杏葉抽出物成分(Ginkgo biloba extract)口服劑型指示藥品中文仿單修訂

指示藥品成分	修正後文字	原文字
Ginkgo biloba extract	<p>一、【使用上注意事項】欄位：</p> <p>(一)「有下列情形者，請勿使用」新增</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 懷孕。 2. 近期將進行手術：因可能增加手術出血之風險。 <p>(二)「有下列情形者，使用前請洽醫師診治」新增：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 癲癇病人：建議避免使用本藥，因本藥可能會誘發癲癇的發作。 2. 正在使用抗凝血劑、抗血小板藥品、非類固醇類抗發炎止痛劑：可能因藥物交互作用而發生不良反應之風險。 <p>(三)「有下列情形者，使用前請先諮詢醫師或藥師、藥劑生」，新增「正在使用任何藥品，包括不是經醫師處方之藥品」。</p> <p>(四)「其他使用上注意事項」新增「如果必須進行手術，請務必告訴醫師正在服用本藥，並在手術前七天停止使用」。</p>	<p>一、於「禁忌」欄位加刊：「懷孕」。</p> <p>二、於「警語及注意事項」欄位加刊：</p> <p>(一)「手術出血風險」：「如果必須進行手術，請務必告訴醫師正在服用本藥品，並在手術前七天停止使用」。</p> <p>(二)「不良反應」：「依據案例報告、臨床研究及上市後資料顯示，使用含銀杏葉抽出物成分(Ginkgo biloba extract)之藥品，可能發生以下不良事件，包含器官（如眼睛、鼻子、大腦和胃腸道）出血、頭痛、頭暈、輕微的胃腸道不適（如腹瀉、腹痛、噁心和嘔吐）及過敏性皮膚反應（如紅斑、皮疹、水腫、癬癢），嚴重者甚至可能發生過敏性休克」。</p> <p>(三)於「特殊族群」欄位加刊：「癲癇病人：建議癲癇病人避免使用含銀杏葉抽出物成分(Ginkgo biloba extract)及已知會降低癲癇發作閾值之藥品。癲癇病人服用銀杏製</p>

二、【警語】欄位：

(一)「服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治」新增：

1. 使用本藥可能出現輕微的胃腸道不適(如腹瀉、腹痛、噁心和嘔吐)，亦可能出現嚴重之不良反應。
2. 器官出血（如眼睛、鼻子）、腦出血（如劇烈頭痛、噁心、嘔吐、意識變差）、胃腸道出血（如吐血、黑便、血便）。
3. 過敏性皮膚反應（如紅斑、皮疹、水腫、搔癢）。

劑產品，無法排除該品會促使其下一次癲癇的發作。

(四)於「藥品交互作用」欄位統一為：

1. Ginkgo biloba 與抗凝血劑（如 phenprocoumon 或 warfarin）或抗血小板藥品（如 clopidogrel、acetylsalicylic acid 及 NSAIDs 等）併用可能會影響抗凝血劑或抗血小板藥品之作用。
2. Ginkgo biloba 與 warfarin 合併使用時，建議應於開始合併使用、改變劑量、停止或更換使用銀杏製劑時，進行凝血功能監測。
3. Ginkgo biloba 可能具有抑制 P-glycoprotein 作用，而因此增加 P-gp 受質藥品（如 dabigatran）之暴露，建議合併 ginkgo biloba 與 P-gp 受質藥品時應謹慎使用。